PERTINENCE DE LA PRESCRIPTION DE LA TSH

Contexte

Dysfonctionnements thyroïdiens fréquents

Population sensible à l'hôpital (sujets enceintes, âgés, cardiaques)

Volumes et coûts en augmentation

Prescription souvent systématique à l'entrée

Indications pour une juste prescription du dosage de la TSH

Après vérification de l'absence d'un bilan < 6 mois

- > **Ne pas prescrire de façon systématique**
- > **En 1ère intention : prescrire une TSH seule**
- > **Chez le patient équilibré : dosage 1 fois par an max**

Devant **tout point d'appel clinique évoquant une dysthyroïdie** (hypo ou hyperthyroïdie) :

- Fibrillation auriculaire, quel que soit l'âge
- Troubles cognitifs ou troubles de l'humeur du sujet âgé

Lors de la découverte d'un **goître** ou d'un **nodule thyroïdien**

Devant une **hypercholestérolémie acquise sévère**

Avant ou pendant un **traitement par amiodarone, lithium, interféron ou immunothérapie anticancéreuse agissant sur PD-1/PD-L1 ou CTLA4** :

- 4 à 6 semaines après le début du traitement
- Tous les 6 mois en suivi lorsque le patient est équilibré

En début de grossesse, si antécédents personnels de dysthyroïdie, de traitement par lévothyroxine ou de symptômes

En cours de grossesse pour le suivi d'une dysthyroïdie ou d'une supplémentation

Chez l'enfant, en cas d'anomalie lors du test de dépistage de l'hypothyroïdie congénitale

Lors de la phase d'équilibration d'un traitement à visée thyroïdienne

- 1 fois tous les 3 mois max, sauf cas particulier (réanimation par ex)

Sources :

HAS 2007 – Hypothyroïdies frustes chez l'adulte : diagnostic et prise en charge

HAS 2000 - Diagnostic et surveillance biologiques de l'hyperthyroïdie de l'adulte

ALD n°30 Guides ALD - Mai 2010 et actualisation Octobre 2012 - Cancer de la thyroïde